VACUNAS RECOMENDADAS PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA Y EN DIÁLISIS

ALCER Federación Nacional

Las personas con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) o en tratamiento renal sustitutivo de diálisis, presentan mayor riesgo de sufrir enfermedades infecciosas y que estas sean más graves. Ello se debe a que la inmunidad en las personas con ERCA está en ocasiones alterada. Las vacunas ayudan a proteger a las personas de enfermedades causadas por infecciones de diferentes virus o bacterias. Algunas enfermedades comunes son la gripe, la COVID-19 (SARS-COV-2), la hepatitis B, el tétanos y el neumococo, entre otras. Existen vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces, y por lo tanto están especialmente recomendadas en ERCA y diálisis.


Debido, a la alteración de la inmunidad, es necesario administrar mayores dosis de vacuna o dosis de recuerdo, como en el caso del virus de la hepatitis B (VHB). Consulta con tu médico y/o tu enfermera/o de referencia para valorar tu caso particular, ya que puede haber vacunas adicionales a las recogidas a continuación.



GRIPE

Es segura y aporta un beneficio a las personas en diálisis. También recomendado para los convivientes.

Tipo de vacuna **inactivada,** se administra anualmente.



SARS-COV-2 (COVID-19)

Es segura y aporta un beneficio a las personas en diálisis. También recomendado para los convivientes.

Tipo de vacuna **inactivada**, se indica seguir con las recomendaciones de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad.


NEUMOCOCO



Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.

Tipo de vacuna **inactivada**. A día de hoy existen varios preparados de vacunas antineumocócicas y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de vacunación previos. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente.


HEPATITIS B



Es segura y aporta un beneficio a las personas en diálisis, especialmente si existe alto riesgo de exposición

Tipo de vacuna **inactivada.** A día de hoy existen varios preparados de vacunas frente a hepatitis B y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de enfermedad pasada o vacunación previos. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente.


GRIPE



Es segura y aporta un beneficio antes y después del inicio de diálisis.

Tipo de vacuna **inactivada**. Podría estar indicada según tratamiento o situación individual. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente


DIFTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA



Es segura y aporta un beneficio antes y después del inicio de diálisis.

Tipo de vacuna **inactivada**, se vacunará según los antecedentes

TRIPLE VÍRICA: (SARAMPIÓN, RUBEOLA, PAROTIDITIS) Y VARICELA



Están indicadas para toda la población, sujetas a valoración profesional si se está recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor.

Se trata de vacunas vivas atenuadas que estarían contraindicadas en las personas que reciban tratamiento inmunosupresor como los que se necesitan tras el trasplante. En caso de precisarlas deberá finalizarse la pauta de vacunación siempre, al menos, 4 semanas antes del trasplante

AVALAN

Referencias:
Ministerio de Sanidad

Asociación Española de Vacunología

Con el aval científico de la Sociedad Española de Nefrología

AVAL CIENTÍFICO SEDEN Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

Se recomienda revisar la vacunación de los convivientes de los pacientes en ERCA y diálisis, sobre todo lo relacionado con la vacunación frente a sarampión, varicela, gripe y COVID-19.

VACUNAS RECOMENDADAS PERSONAS CON UN TRASPLANTE DE RIÑÓN

ALCER Federación Nacional

Las personas que van a ser receptor de un trasplante de riñón presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, que sean más graves y puedan comprometer la supervivencia del órgano trasplantado. Existen vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces y por lo tanto están especialmente recomendadas. Se recomienda administrarlas antes del trasplante, o a partir de los 3-6 meses posteriores al trasplante, según el tipo de vacunas, porque durante los primeros meses la respuesta a la vacuna es más baja. Consulta con tu médico y/o tu enfermera/o de referencia para valorar tu caso particular, ya que puede haber vacunas adicionales a las recogidas a continuación.



GRIPE

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante. También recomendado para los convivientes.

Tipo de vacuna **inactivada**, se administra anualmente.



SARS-COV-2 (COVID-19)

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante. También recomendado para los convivientes.

Tipo de vacuna **inactivada**, se indica seguir con las recomendaciones de la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad.

NEUMOCOCO


Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.



Tipo de vacuna inactivada. A día de hoy existen varios preparados de vacunas antineumocócicas y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de vacunación previos. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente.

HEPATITIS B

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.



Tipo de vacuna **inactivada**, A día de hoy existen varios preparados de vacunas frente a hepatitis B y las indicaciones pueden variar en función de la Comunidad Autónoma y los antecedentes de enfermedad pasada o vacunación previos. Por tanto, se recomienda consultar de manera específica con el Servicio de Medicina Preventiva o el Centro de Salud correspondiente.

DIFTERIA- TÉTANOS (dT)

Es segura y aporta un beneficio antes y después del trasplante.



Tipo de vacuna **inactivada**, se vacunará según los antecedentes previos de vacunación.

HERPES ZÓSTER



Es segura y aporta un beneficio. Vacunar a partir de los 3 meses del trasplante.

Tipo de vacuna inactivada, se administra dos dosis con pauta de 0-2 meses.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO



Es segura y aporta un beneficio. Indicada para mujeres hasta los 45 años.

Tipo de vacuna **inactivada**, se administra en 3 dosis con dos posibles pautas. 0-1-6 meses o 0-2-6 meses.

Referencias:
Ministerio de Sanidad

AVALAN

Asociación Española de Vacunología

Con el aval científico de Sociedad Española de Nefrología

AVAL CIENTÍFICO SEDEN Sociedad Española de Enfermería Nefrológica.

Se recomienda revisar la vacunación de los convivientes de los pacientes en ERCA y diálisis, sobre todo lo relacionado con la vacunación frente a sarampión, varicela, gripe y COVID-19.